SONDAGE ALLEMAND du 08/ 09 /2017

Source :https://www.borreliose-nachrichten.de/auswertung-unserer-umfrage-unter-betroffenen/

1306 personnes interrogées.

70,60 % de femmes et 29,40 % d'hommes.



Vous souvenez- vous d'avoir été piqué ?



826 (63,25%) des personnes interrogées se rappellent d' une piqûre de tique.



41,35% des déclarants ont eu un érythème migrans,

19,14% des patients interrogés étaient diagnostiqués « malades de Lyme » .



51,99% des patients interrogés ont été traités pendant plus de 3 semaines aux antibiotiques



43,25% des sujets interrogés ont été testés pour des co-infections .



70,10% des répondants traités pendant plus de 3 semaines aux antibiotiques ont vu leurs symptômes s'améliorer



49,12% des répondants qui ont pris moins de 3 semaines d' antibiotiques ont connu une amélioration des symptômes.



Conclusion: 90,58% des répondants ont fait des rechutes ou ont eu des symptômes persistants , malgré un traitement antibiotique

Combien de médecins vous avez consultés pour pouvoir poser le diagnostic de la maladie?

Personnes interrogées: 1306

Total des médecins: 9367 visites

Nombre moyen: 7,17



80,86% des répondants n'ont pas eu le diagnostic de la maladie de Lyme lors du premier contact avec un médecin.

Quel est le temps écoulé entre les premières plaintes et le diagnostic?

weniger als 6 Monate	150
6 Monate bis weniger als 12 Monate	128
1 Jahr bis weniger als 2 Jahre	149
2 Jahre oder länger	629 **(59,56%)**

Les 30 principaux symptômes enregistrés sous ses diverses formes:

(Nous avons une listede 30 principaux symptômes établis en fonction de la lisibilité statistique.)



Pour 96,32% des patients interrogés, les symptômes apparaissent sous forme de poussées et de rémissions de durée variable.

Sehr stark	397
Stark	519
Mittel	273
Schwach	69



97,70% des personnes interrogées connaissent des symptômes d' épuisement, de perte d'efficacité, de manque d'endurance et/ou d'énergie.

Sehr stark	698
Stark	405
Mittel	128
Schwach	45



87,75% des personnes interrogées se plaignent de douleurs articulaires / -d'oedèmes des bras / des mains / des doigts.

Sehr stark	308
Stark	369
Mittel	287
Schwach	182



87,90% des personnes interrogées connaissent des douleurs articulaires et/ ou d'oedèmes aux jambes et /ou aux pieds.

Sehr stark	341
Stark	352
Mittel	259
Schwach	196



92,73% des répondants ont des douleurs au dos et à l'épaule.

Sehr stark	434
Stark	390
Mittel	265
Schwach	122



92,11% ont des maux de tête et de nuque avec raideurs.

Sehr stark	417
Stark	387
Mittel	271
Schwach	128



90,74% des personnes ressentent des brûlures, les picotements à différents endroits du corps.

Sehr stark	346
Stark	405
Mittel	297
Schwach	137



82,85% des personnes ont une vision floue, un voile, voient des « corps flottants »ou ont des inflammations oculaires.

Sehr stark	220
Stark	302
Mittel	354
Schwach	206



75,50% des personnes ont des troubles de l'audition, entendent des sifflements, des bruissements ou ont des acouphènes.

Sehr stark	205
Stark	238
Mittel	289
Schwach	254



80,17% des personnes ont des sensations d'engourdissement ou des paralysies.

Sehr stark	160
Stark	271
Mittel	357
Schwach	259



90,05% des utilisateurs ressentent des sensations de froid intense ou au contraire transpirent, d'autres ont un ressenti des températures perturbé.

Sehr stark	362
Stark	386
Mittel	285
Schwach	143



83,00% répondent connaître des problèmes d'incertitude dans la marche ou la préhension.

Sehr stark	191
Stark	305
Mittel	381
Schwach	207



80.86% des personnes ont des perturbations de la motricité et de la coordination des mouvements.

Sehr stark	104
Stark	279
Mittel	371
Schwach	302



83,15% déclarent avoir des sueurs nocturnes.

Sehr stark	263
Stark	313
Mittel	281
Schwach	229



75,73% des répondants ont des besoins impérieux d'uriner la nuit.

Sehr stark	148
Stark	257
Mittel	319
Schwach	265



91,81% des répondants ont des courbatures musculaires

Sehr stark	373
Stark	402
Mittel	274
Schwach	150



76,65% des personnes interrogées connaissent des perturbations fonctionnelles de la vessie et/ou des dysfonctionnements sexuels.

Sehr stark	194
Stark	299
Mittel	303
Schwach	205



92,80% connaissent des perturabtions du sommeil (trop/ trop peu / problèmes d'endormissement / jamais de nuit complète)

Sehr stark	477
Stark	402
Mittel	224
Schwach	109



83,46% des répondants ont des vertiges .

Sehr stark	190
Stark	251
Mittel	355
Schwach	294



92,73% ont des problèmes de concentration, de mémoire, des troubles de la perception ou d'orientation.

Sehr stark	341
Stark	426
Mittel	297
Schwach	147



88,67% ont des problèmes pour trouver les mots

Sehr stark	198
Stark	340
Mittel	388
Schwach	232



81,24% des personnes souffrent de « brouillard cérébral »ou ont des symptômes de démence.

Sehr stark	221
Stark	316
Mittel	281
Schwach	243



74,04% des personnes présentent des symptômes psychiatriques.

Sehr stark	166
Stark	238
Mittel	309
Schwach	254



81,85% des patients sont éssoufflés ou/ et sont en détresse respiratoire lors d'un simple effort.

Sehr stark	207
Stark	328
Mittel	304
Schwach	230



68,22% des répondants ont des infections respiratoires.

Sehr stark	107
Stark	204
Mittel	289
Schwach	291



85,91% ont problèmes cardiovasculaires, par exemple : une augmentation de la pression artérielle, une arythmie, des palpitations.

Sehr stark	240
Stark	339
Mittel	346
Schwach	197



83,84% des personnes ont des symptômes gastro -intestinaux.

Sehr stark	248
Stark	286
Mittel	343
Schwach	218



73,43% des personnes interrogées ont noté une modification de leur poids : prise ou perte de poids sans modification de leur régime alimentaire.

Sehr stark	222
Stark	248
Mittel	275
Schwach	214



79,25% des personnes interrogées ont des problèmes cutanés : démangeaisons, modifications etc.

Sehr stark	180
Stark	244
Mittel	346
Schwach	265



57,20% des personnes interrogées notent une perte de cheveux

Sehr stark	123
Stark	162
Mittel	227
Schwach	235

Source :
https://www.borreliose-nachrichten.de/auswertung-unserer-umfrage-unter-betroffenen
Traduction : Chantal BAUMERT LSF 06/08/2018